

SUÍNOS PUROS

Landrace - BP 300
Large White - BP 330
Duroc - BP 350
Pietrain - BP 375

SUÍNOS HÍBRIDOS

Fêmeas Híbridas
BP 400 BP 500
BP 410 BP 450
BP 420 BP 101
Machos Híbridos
BM 500 MS 115
BP 450 BS 101

RECOMENDAÇÃO NO MANEJO DE MACHOS

O objetivo desta recomendação é explorar ao máximo o potencial genético do reprodutor, e melhorar os índices reprodutivos do seu plantel.

Machos

- Não permitir contato direto ou indireto do macho com as leitoas antes de completar 5 meses de idade;
- Fornecer aos machos de 2 a 2,5 kg de ração de crescimento por dia, dependendo do seu estado corporal, até iniciarem a vida reprodutiva.
- Passar por um período de adaptação de no mínimo 4 semanas antes de realizar a primeira cobertura;
- Iniciar o treinamento do macho em coberturas aos 7 meses, levando-o várias vezes à baía de cobertura antes de fazer a primeira cobertura;
- Utilizar uma fêmea que esteja com perfeito reflexo de imobilidade para fazer a primeira cobertura, observando uma igualdade no tamanho do macho e a fêmea;
- Realizar a cobertura na baía de cobertura, com piso não escorregadio. Recomenda-se o uso de maravalha sobre o piso;
- Antes da cobertura, realize a limpeza e esgotamento do prepúcio (após secar com papel limpo), bem como, observe se não existe nenhuma alteração no cachaço (orquite, sinal de infecção, etc.);
- Supervisionar a monta. Retire a fêmea se a mesma for agressiva. Se o macho montar incorretamente, gentilmente coloque-o na posição correta;
- Realizar no máximo 2 montas por semana (1 fêmea coberta) entre 7 e 9 meses de idade, no máximo 4 montas por semana (2 fêmeas cobertas) entre 10 e 12 meses de idade e até 6 montas por semana com idade acima de 1 ano;
- Conduzir com calma os machos e as fêmeas para a baía de cobertura, usando tábua de manejo e nenhum tipo de mau trato;
- Fazer as cobrições sempre após o arraçoamento dos animais e nas horas mais frescas do dia, início e fim da jornada de trabalho;
- Cuide da saúde do reprodutor, ele pode ser um transmissor de doenças reprodutivas entre as matrizes de seu plantel.
- Fornecer diariamente aos machos, após iniciarem a vida reprodutiva, ração de gestação de acordo com seu peso (Tabela 12);

Tabela 12. Arraçoamento de cachaços adultos.

Arraçoamento diário	Peso vivo dos cachaços (kg)		
	120 a 150	150 a 200	200 a 250
Quantidade fornecida (kg/dia)	2,1 kg	2,4 kg	2,8 kg

FONTE: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Suinos/SPSuinos/manejoprodu.html#machos>